尼崎市健診結果構造図 別添2 様 歳 健診日: 内臓脂肪から始まる生活習慣病を防ごう! 治療中の疾患は□の中に「治」が入っています。結果値が基準値を超えている場合は色が付いています。 4 5 6 7 8 9 ただし基準値を超えていなくても治療中の場合は水色で表示します。 危険度 生 人工透析 失明 活 切断 1= 閉塞性 脳卒中 心臓病 認知症 健 影 動脈硬化 康 慢性腎臓病 糖尿病合併症 くも膜下 響 障 出血 が 狭心症 心筋梗塞 脳梗塞 脳出血 害 出 糖尿病性腎症 遺伝(遺伝(遺伝(ま 慢性 す 腎不全 神経 網膜症 障害 遺伝()既往(:頚部動脈の変化 冠動脈の変化など 動脈の変化 MMSE 頚部エコ-心電図所見 クレアチニン 尿蛋白 PWV(脈波伝播速度) 細動脈の変化 /30点 内中膜複合肥厚度 左 眼底検査 基進 右 血 基準(~1400) cm/S mm 左 基準(H()S()(H0S0) 基準(24~) 基準値(ABI(足関節/上腕血圧比) 管 尿潜血 eGFR (推算値) 糖尿病による網膜変化 プラーク മ CRP 基準(0.9~1.3) mr 変 あり 基準(60~) 基準(-) 間歇性跛行(有・無) mg/dl 微量アルブミン尿 化 所見(基準値(~0.1未満) (~30未満). 収縮期 拡張期 LDLコレステロール 血糖 尿酸 血圧 基準 血 重症 180以上 または 110以上 1回目 空腹時 管 (~ 99) 中等症 160~179 または 100~109 随時 が (~ 139) 軽症 140~159 #tht 90~99 基準(~ 未満) 2回目 基準(~ 7.0) 正常高値 130~139 または 85~89 傷 HbA1c* (~ 5.5) non HDL 130未満 かつ 3 尿 糖 遺伝(平均 至適 120未満 かつ 80未満 コレステロール 始 胃・十二指腸の手術(有・無) 75g糖負荷検査 遺伝(め 妊娠時の尿糖陽性(有・無)女性 H29.6.26 る 自 基準(~ 未満) HbA1c 中心血圧 遺伝 mmHa 覚 反射圧 mmHg HOMA-R 症 .結果(状 中性脂肪 筋肉 は (男7kg/m²以上) あ 筋量 (女5.4kg/m²以上) インスリン抵抗性 高インスリン血症 IJ 握力(左) (左右どちらかが 基準(空腹 ~149) 男 26kg以上 ま 握力(右) 女 18kg以上) HDLコレステロール 世 内臓肥満 潜 標準体重 Κg 在 基準(40~) Kg 身長 =(身長m)²×22 現在の体重 c m 的 BMIが22である体重 基準 BM I 1= 体重 酒 肥満 25 以上 進 普通 18.5 ~ 24.9 (身長m)² 以下 痩せ 18.4 (男38.5~45.9%) 肝機能 ヘマトクリット 基準 腹囲 内臓脂肪面積 (女35.5~43.9%) 基準 (男400~539万/mm³) 赤血球 AST(GOT) (~30 cm未満 基準 100cm²未満 (女360~489万/mm³ (男13.1~17.9g/dl) ALT(GPT) (~ 30) 血色素 過去の体重 20歳頃の体重 (女12.1~15.9g/dl))Kg y - GT (~ 50) 血小板 (13.0~34.9万/mm³) $(\gamma - GTP)$ 最高体重()歳頃)Kg (※ HbA1cは国際標準値を表示 職種 飲酒量(日本酒、ビール、焼酎) たばこ 見暮 つら 酒の肴の種類 めし 0時 6時 12時 24時 18時 るを 製作・著作 尼崎市「本市の許可なく無断転載・転用を禁ずる」

No.